



# Wysoce zjadliwa grypa ptaków

## – lista kontrolna elementów BIOASEKURACJI



### Obiekty

- drób utrzymywany jest w odosobnieniu, w szczególności w zamkniętych obiektach lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami\*
- pasza dla ptaków przechowywana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami
- słoma służąca jako ściółka jest skutecznie zabezpieczona przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w zamknięciu odbywa się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;
- woda do pojenia pobierana jest tylko z miejsc efektywnie zabezpieczonych przed dostępem dzikich ptaków i gryzoni
- przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, wyłożone są maty dezynfekcyjne (w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa), oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego

- wszystkie wejścia na fermę zaopatrzone są w odpowiednie oznakowania, np. „Zakaz wstępu nieupoważnionym osobom”
- obiekty są zabezpieczone przed dostępem ptaków i innych zwierząt dzikich, gryzoni, jak również zwierząt towarzyszących
- na terenie fermy nie może przebywać inny drób niż utrzymywany w obiekcie produkcyjnym
- dokonywany jest codzienny przegląd stad drobiu oraz prowadzona jest dokumentacja zawierająca informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku spożycia paszy i wody oraz odsetek nieśności, z imiennym wskazaniem osoby przeprowadzającej perlustrację

### Personel

- osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, stosują jednorazowego użytku odzież ochronną oraz obuwie ochronne, przeznaczone do użytku wyłącznie w danym budynku
- osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu stosują zasady higieny osobistej, takie jak mycie rąk przed wejściem i wyjściem do i z budynków fermy
- osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powstrzymują się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu

- posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczynowość, biegunka, nagły spadek nieśności
- na fermie nie mogą być zatrudnieni pracownicy posiadający i obsługujący własny drób

#### Wyposażenie

- sprzęt i narzędzia wprowadzone na fermę muszą być przed użyciem umyte i zdezynfekowane, a przechowywane są w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami dzikimi i ich odchodami
- pojemniki transportowe dla drobiu, podnośniki, rampy, są przed użyciem myte i dezynfekowane
- opakowania plastikowe na jaja konsumpcyjne są myte i dezynfekowane, a opakowania kartonowe i wytłaczanki jednorazowe są po użyciu poddawane utylizacji

#### Pojazdy

- pasza przeznaczona dla drobiu zgodnie z kierunkiem produkcji jest rozładowywana spoza ogrodzenia silosów/fermy
- kierowcy, którzy w danym dniu wizytowali już gospodarstwo utrzymujące drób, nie mogą wchodzić do pomieszczeń innego gospodarstwa, w których jest utrzymywany drób
- pojazdy przewożące obornik nie odwiedzają więcej niż 1 gospodarstwa w tym samym dniu

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia, wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji

- gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszania, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu

Jeśli nie jest możliwe stworzenie zadaszania:

- wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, które położone są min 500 metrów od zbiorników wodnych, typu rzeka, staw, jezioro
- wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia dla lepszego nadzoru powinna wynosić co najmniej 0,5 m<sup>2</sup> na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej i maksymalnie 19 kg na 1 m<sup>2</sup> dla młodych gęsi rzeźnych
- teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzone w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy (zarówno dźwiękowych jak i wizualnych) dla ptaków dziko żyjących
- na wybiegach zakazane jest karmienie i pojenie
- gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych
- w czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m<sup>2</sup> powierzchni wybiegu

Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:

- teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi
- stosowanie ściółki na wybiegu możliwe jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu
- prowadzony jest codzienny rejestr ustalonych godzin udostępniania gęsiom wybiegu, zużycia środków dezynfekcyjnych, awarii i napraw wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkich stwierdzonych na terenie wybiegu i w jego okolicy zaburzeń w stanie zdrowia klinicznego u gęsi, gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich anomalii zdrowotnych

\* pogrubioną czcionką zaznaczono nakazy wynikające z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091)

